



*Ministerio de Salud*  
**Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos**  
**A.N.M.A.T.**

Buenos Aires, 27 MAY 2009

**Ministerio de Salud de la Nación**  
**Sra. Ministra**  
**Lic. Graciela Ocaña**  
S / D

Tengo el agrado de dirigirme con el fin de elevarle informe sobre recomendaciones acerca del uso del OSELTAMIVIR en niños.

Para su conocimiento.

Sin otro particular, la saludo con mi mas distinguida consideración.

DIRECCION NACIONAL DE PREV. DE ENF. Y RIESGOS	
REGISTRO N° 778	
ENTRÓ 27 MAY 2009	SALIÓ

**Intervención ANMAT**  
**Nota ANMAT N° 0613/09**  
bd

CC :.Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Dr. Carlos Alberto Soratti  
Dirección Nacional de Prevención de Enfermedades y Riesgos  
Dr. Hugo Fernández

DR. RICARDO MARTINEZ  
INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



"2009, Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz"

**Ministerio de Salud**  
**Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos**  
**A.N.M.A.T.**  
**Instituto Nacional de Medicamentos**

Nota N° 331 /09

**ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,**  
**ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**  
**SR. INTERVENTOR**  
**DR. RICARDO MARTINEZ**  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Por medio de la presente, se remiten las recomendaciones para farmacéuticos hospitalarios acerca del uso del OSELTAMIVIR en niños que no pueden tragar cápsulas, ante situación de alerta epidemiológica por gripe a virus H1N1 definida por el Ministerio de Salud de la Nación.

Este procedimiento no deberá usarse para niños menores de 1 año cuya dosis prescrita sea menor de 30 mg., o para dosis prescritas intermedias donde no pueda utilizarse el contenido integro de la cápsula.

Se requieren para niños de 1 a 5 años:

1. Una cápsula de TAMIFLU de 30 o 45 mg., según prescripción médica.
2. Un pequeño recipiente tipo bowl (vidrio u acero inoxidable) y una espátula pequeña de plástico duro o cucharita.
3. Un alimento de gusto agradable que el niño acepte, preferentemente de consistencia cremosa tipo flancito, en pequeña cantidad, para mezclar con el medicamento y enmascarar su sabor.

Evitar jugos de frutas cítricas, miel y líquidos calientes.

0613



Procedimiento:

1. En una zona previamente limpia, con las manos bien lavadas con abundante abundante agua y jabón y secas, proceder a retirar una cápsula del blíster.
2. Sobre el bowl o recipiente dejar caer el contenido de la cápsula.

Para ello se debe tomar, con las manos secas, un extremos de la cápsula con cada mano y rotar suavemente tirando hacia afuera para que se separen las dos mitades de la cápsula,



"2009, Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz"

**Ministerio de Salud**  
**Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos**  
**A.N.M.A.T.**  
**Instituto Nacional de Medicamentos**

que son de distinto color. Verificar que todo el polvillo blanco de su interior se deposite en el fondo del bowl.

*Precaución: manejar el contenido de la cápsula con cuidado ya que el polvillo es irritante para la piel y los ojos.*

3. Incorporar una o más cucharaditas del alimento de sabor agradable, mezclar cuidadosamente y dárselo al niño, asegurándose de que todo el polvillo haya sido ingerido.

También puede comenzarse con postre solo y luego intercalar la mezcla, para su mejor aceptación.

c/c: Sr. Subinterventor - Dr. Daniel Gollan

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS**  
Ciudad de Buenos Aires, 22 de Mayo de 2009  
dr

  
**Dr. CARLOS A. GHIALE**  
Director  
Instituto Nacional de Medicamentos