

PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DE EMERGENCIA

Guías médicas y de entrega de servicios
en América Latina y el Caribe 2013
1ª. edición electrónica

www.flasog.org FLASOG (Fed. Lat. Am. Soc. Ob. Gyn)

www.clae-la.org CLAE Consorcio Latinoamericano AE

Resumen clínico.

Pág. 5 **Uso repetido de PAE:** Las PAE de LNG se pueden usar con tanta frecuencia como sea necesario pero no se recomienda tomarlas más de una vez cada 24 horas, en los casos en que hubo múltiples relaciones sexuales. El uso repetido de PAE de LNG es muy seguro.

Las PAE no deben usarse deliberadamente en forma repetida ni como método anticonceptivo de rutina ni de uso regular. A las mujeres que no desean embarazarse en el futuro, se les recomienda que después de usar las PAE inicien o retomen el uso regular de un método anticonceptivo establecido

“.....levonorgestrel administrados varias veces por ciclo no causan efectos secundarios serios.

El efecto secundario más común fue sangrado irregular.

Estos datos ofrecen la tranquilidad de que las mujeres pueden usar en forma segura el régimen de levonorgestrel todas las veces o con la frecuencia que lo requieran.

Algunos/as expertos/as recomiendan que no se requiere más de una dosis en un período de 24 horas.

Soc. Española de Contracepción (SEC)

Información científica relevante sobre la anticoncepción de urgencia

Idoneidad de la libre dispensación de la AU-LNG

La Anticoncepción de Urgencia-LNG cumple los criterios de la Food and Drug Administration (FDA) y de la Agencia Europea del Medicamento para su dispensación “sin receta médica”, como son:

- No es tóxico.
- No causar defectos congénitos.
- No existe riesgo de sobredosificación.
- No tiene riesgo de adicción.
- No tiene contraindicaciones
- No tiene interacciones medicamentosas
- Indicación claramente establecida
- Uso sencillo